Flora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

WIOSNA

WAWRZYNEK WILCZEŁYKO

Wygląd: krzew wielkości 0,3-1,5m o drobnych, różowych kwiatach

Pora kwitnienia: II— IV

Miejsce występowania: bory mieszane, lasy liściaste (zwłaszcza grądy i buczyny)

Roślina objęta ochroną gatunkową, trująca.

Flora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

WIOSNA

Podbiał pospolity

Wygląd: pędy kwiatowe obficie okryte łuskami, żółty kwiatostan koszyczkowy o średnicy do 22cm, liście pojawiają się po przekwitnieniu

Pora kwitnienia: III— V

Miejsce występowania: rowy, przydroża, brzegi wód, zarośla, olsy, pola i łąki

Nazwa łacińska *Tussilago farfara* nawiązuje do właściwości leczniczych rośliny, łacińskie *tussis* = kaszel. Inne nazwy ludowe i zwyczajowe to: białkuch, ośla stopa, boże liczko, kniat; w języku kaszubskim - kobiór.

Flora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

WIOSNA

Przylaszczka pospolita

Wygląd: kwiaty niebiesko-fioletowe (wyjątkowo mogą być różowe lub nawet białe), nowe liście pojawiają się pod koniec kwitnienia rośliny

Pora kwitnienia: III— V

Miejsce występowania: lasy liściaste

Łacińska nazwa *Hepatica nobilis* pochodzi od liści, które kształtem przypominają wątrobę, *hepaticos*=wątroba. Roślina trująca.

Flora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

WIOSNA

ZAWILEC GAJOWY

Wygląd: białe, pojedyncze kwiaty, często tworzy zwarte kobierce

Pora kwitnienia: III— V

Miejsce występowania: lasy liściaste i mieszane

Produkuje duże ilości pyłku, z którego chętnie korzystają dzikie zapylacze. Kwiaty zawilca gajowego, dla inaczej niż my widzących owadów, mają barwę niebieskozieloną. Roślina trująca.

Flora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

WIOSNA

ZAWILEC ŻÓŁTY

Wygląd: 1-2 żółte kwiaty

Pora kwitnienia: III— V

Miejsce występowania: lasy liściaste i mieszane

Produkuje duże ilości pyłku, z którego chętnie korzystają dzikie zapylacze.

Znacznie rzadszy od zawilca gajowego. Roślina trująca.

Flora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

WIOSNA

Jasnota biała

Wygląd: białe, okółkowo ułożone, o grzbiecistej budowie kwiaty, bez nich przypomina pokrzywę zwyczajną i bywa też błędnie nazywana nieparzącą pokrzywą, w sprzyjających warunkach tworzy zwarte skupiska,

Pora kwitnienia: IV– XI

Miejsce występowania: parki, ogrody, obrzeża lasów, pobocza dróg, zarośla

Roślina lecznicza. Ssanie nektaru z kwiatów jasnoty było kiedyś dość powszechne wśród dzieci i traktowane jak zabawę.

Flora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

WIOSNA

Jasnota purpurowa

Wygląd: różowopurpurowe kwiaty o grzbiecistej budowie są okółkowo ułożone w kątach liści,

Pora kwitnienia: III– XI

Miejsce występowania: parki, ogrody, obrzeża lasów, pobocza dróg, zarośla

Jasnota wytwarza kwiaty dostosowane budową do zapylania przez owady długossawkowe, takie jak np. trzmiele.

Flora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

WIOSNA

Bluszczyk kurdybanek

Wygląd: roślina o niebieskich kwiatach i zaokrąglonych, sercowatych liściach

Pora kwitnienia: IV– VII

Miejsce występowania: lasy liściaste, zarośla, łąki, parki i ogrody

Dość osobliwa nazwa wywodzi się od bogato zdobionych np. w motywy roślinne kurdybanów, czyli skór zwierzęcych używanych m.in. do obijania mebli.

Listki bluszczyku (nie mylić z bluszczem) w dawnej kuchni polskiej były dorzucane do rosołu lub zupy ziemniaczanej jako zamiennik pietruszki. Roślina lecznicza.